

PAIN EXPELLER 300 mg

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Scheduling Status:

SO

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER 300 mg Tablets

Aspirin

Contains sugar (sucrose): 3,30 mg per tablet

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless, you still need to use DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER with any other person.
- Ask your healthcare provider or pharmacist if you need more information or advice.
- You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 10 days.

What is in this leaflet:

1. What DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is and what it is used for
2. What you need to know before you take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER
3. How to take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER
4. Possible side effects
5. How to store DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER
6. Contents of the pack and other information

1. What DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is and what it is used for:

The active ingredient in DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is aspirin. It works to relieve pain of moderate intensity. DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER tablets are indicated for the relief of pain of moderate intensity.

2. What you need to know before you take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

Do not take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

- If you are hypersensitive (allergic) to aspirin or to any of the other ingredients in DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.
- If you have or have had severe heart problems.
- If you have a history of gastrointestinal bleeding associated with NSAIDs.
- If you have or have ever had a stomach ulcer, perforation or bleeding.
- If you suffer from severe kidney impairment.
- If you have a bleeding disorder.
- If you are using oral anticoagulant medicines.
- If you are pregnant or breastfeeding your infant.
- If you are under 12 years of age (see Warnings and precautions).

Warnings and precautions:

Take special care with DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

- You should not use DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER continuously for longer than ten days without consulting your doctor.
- When given to children DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER may cause Reye's syndrome. Reye's syndrome is a very rare disease, which can be fatal. For this reason, DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER should not be given to children aged under 12 years, unless on the advice of a doctor (see Do not take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER).
- If you develop serious skin reactions, skin rash, chest tightness, wheezing or difficulty breathing, you should stop taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER immediately.

Tell your doctor or pharmacist before taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER if you:

- have a history of allergic reactions to NSAIDs, including attacks of asthma, swelling of your face, lips and tongue, hives, itchy skin or runny nose,
- have other allergies or asthma,
- have high blood pressure and/or suffer from heart problems. DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER may be associated with a small increased risk of heart failure,
- are an elderly person. You may be more susceptible to the side effects of DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER,
- have a history of inflammatory bowel diseases such as ulcerative colitis or Crohn's disease (chronic inflammation and sores in the innermost lining of your colon),
- have a history of gastrointestinal diseases such as hiatus hernia, gastroesophageal reflux disease (a condition in which the stomach contents leak backwards from the stomach into the oesophagus, causing heartburn), or bleeding from the gastrointestinal tract,
- are scheduled for a surgical procedure. You must stop using DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER several days before your surgery,
- suffer from liver or kidney problems,
- have anaemia or suffer from a deficiency of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD),
- have diabetes,
- are dehydrated (you may feel thirsty and have a headache, dry mouth and lips).
- develop symptoms such as a high body temperature, widespread rash, swollen glands or facial swelling. This reaction can also include kidneys, liver, and heart dysfunction as well as abnormal blood test results (for example an abnormal increase in the number of disease-fighting white blood cells).

Ask your doctor if you are unsure if any of the above applies to you.

Taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER while you are 20 weeks or more than 20 weeks pregnant may cause serious kidney problems in your unborn baby. This may cause a delay in your babies' lung development, as well as result in limb disabilities.

Regular use of DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER may result in increased blood pressure in your baby's lungs. The onset of labour may be delayed and its duration increased. You should not take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER during pregnancy or while breastfeeding your baby.

Other medicines and DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other medicine (this includes complementary or traditional medicines).

It is especially important to tell your doctor if you are taking the following medicines:

- other non-steroidal anti-inflammatory drugs - NSAIDs (such as ibuprofen, naproxen, fenbufen, indometacin and piroxicam),
- corticosteroids (to suppress the immune system),
- medicines used to prevent blood clotting such as warfarin,
- SSRIs such as sertraline or paroxetine (medicines to treat depression),
- medicines which make your urine more alkaline such as antacids,
- medicines used to treat gout such as probenecid and sulfapyrazone,
- mifepristone (to induce abortion),
- sulphonylureas (antidiabetics),
- methotrexate (to treat some cancers, psoriasis and rheumatic disease),
- phenytoin or sodium valproate (to treat epilepsy),
- zafirlukast (to treat asthma),
- metoclopramide (to prevent sickness),
- metoprolol (to treat angina),
- acetazolamide (to treat glaucoma),
- barbiturates and other sedatives.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER may interfere with some blood and urine tests. If you need to have blood and urine tests, tell your doctor you are taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER with food or drink:
You should not drink alcohol while you are taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.

Pregnancy and breastfeeding:

If you are pregnant or breastfeeding your baby, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare provider for advice before taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.

You should not take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER during pregnancy or while you are breastfeeding your baby.

Driving and using machines:

It is not always possible to predict to what extent DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER may interfere with the daily activities of a patient. You should be aware of how you react to DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER before you drive or operate machinery.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER contains sucrose:

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.

3. How to take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

Do not share medicines prescribed for you with any other person.

Always take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER exactly as directed in this leaflet or as your doctor or pharmacist or nurse has told you. Check with your doctor or pharmacist or nurse if you are not sure.

Use the lowest effective dose for the shortest possible duration of treatment.

ADULTS: The recommended dose is one or two tablets three times a day with water.

If you take more DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER than you should:

In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available contact the nearest hospital or poison centre. Take this leaflet and any remaining tablets with you.

Symptoms of an overdose include ringing in the ears, spinning sensation, deafness, sweating, nausea, headache, vomiting, confusion, fast breathing rate, fever, coma and heart failure.

If you forgot to take DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

If you missed a dose, take it as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and continue to take the tablets at the usual time. Do not take a double dose to make up for the forgotten individual doses.

4. Possible side effects:

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER can have side effects. Not all side effects reported for DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare provider for advice.

If any of the following happens, stop taking DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER and tell your doctor immediately or go to the casualty department of your nearest hospital:

- You have an allergic reaction. The signs may include a skin rash, swallowing or breathing problems, wheezing, worsening of asthma, swelling of your lips, face, throat or tongue.
- You get blistering, peeling, bleeding, scaling or fluid filled patches on any part of your skin. You may have a serious skin problem.
- You have a fever and yellowing of the skin or whites of the eyes, feel tired, weak or generally unwell, loss of appetite (anorexia), feeling sick (nausea), being sick (vomiting). These may be early signs of liver problems.
- Stomach ulcers or bleeding which can be severe (you may develop bloody or black tarry stools, severe stomach pain and vomit blood), stomach irritation (mild stomach pain, heartburn and feeling or being sick).
- If you develop flu-like symptoms with a high body temperature, widespread rash, swollen glands, facial swelling and abnormal blood results (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)).

These are all very serious side effects. If you have them, you may need urgent medical attention or hospitalisation.

Other side effects include:

- Longer bleeding time.
- Reduction of red blood cells which can make the skin pale and cause weakness or breathlessness, changes in numbers and types of blood cells seen in blood tests.
- Dizziness
- Swelling
- High blood pressure and heart failure.
- Stomach ulcers
- Bleeding from the gastrointestinal tract.
- Nausea (feeling sick), vomiting (being sick), diarrhoea.
- Indigestion, constipation, stomach pain.
- Vomiting blood or blood in your stool.
- Worsening of inflammatory bowel diseases.
- Liver problems
- Itchy skin rash caused by allergic reaction, pale or red irregular raised patches with severe itching (hives).
- Blistering, peeling, bleeding, scaling or fluid filled patches on any part of the skin.
- Runny nose
- Difficulty breathing or wheezing, worsening of asthma.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

Reporting of side effects:

If you get side effects, talk to your doctor or pharmacist or nurse. You can also report side effects to SAHPRA via the "6.04 Adverse Drug Reaction Reporting Form", found online under SAHPRA's publications: https://sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/01/6.04_ARF1_v5.1_27Jan2020.pdf. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER.

5. How to store DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

Store all medicines out of reach of children.
Store in a well-closed container at or below 25 °C in a dry place.

Do not dispose of unused medicine in drains and sewerage systems (e.g. toilets).

Return all unused medicine to your pharmacist.

6. Contents of the pack and other information:

What DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER contains:

The active substance is aspirin.
The other ingredients are maize starch, talc and sugar and starch granules consisting of benzoic acid (preservative), gelatine powder, maize starch and sucrose.

What DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER looks like and contents of the pack:

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is a round, white scored tablet with acidic taste and odour.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is packaged in OPA-aluminium-PVC blisters.

Blisters contain seven or ten tablets per strip. Two or three strips are inserted together with the package insert per outer carton.

Pack sizes: 14 or 30 tablets per outer carton.

Holder of Certificate of Registration:

iPharma (Pty) Ltd
124 Elevation Avenue, Randjesfontein
Midrand, 1683, South Africa

Tel. no.: (011) 314 2366

This leaflet was last revised in:

07 January 2022

Registration number:

B/2.8/977

The full Professional Information leaflet is available from iPharma (Pty) Ltd, please email info@ipharma.co.za to request a digital copy.

PAIN EXPELLER 300 mg

PASIËNTE INLIGTINGSBLAD

Skeduleringstatus:

S0

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER 300 mg tablette

Aspirien

Bevat suiker (sukrose): 3,30 mg per tablet

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is sonder 'n dokter se voorskrif vir u beskikbaar om 'n matige siekte te behandel. U moet DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER nogtans versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te verkry.

- Hou hierdie blad. Dit mag nodig wees dat u dit weer moet lees.
- Moenie DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER aan enige ander persoon gee nie.
- Vra vir u gesondheidsorgverskaffer of apoteker as u nog inligting of raad nodig het.
- U moet 'n dokter raadpleeg as u simptome vererger of nie binne 10 dae verbeter nie.

Wat in hierdie blad is:

1. Wat DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat u moet weet voor dat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink
3. Hoe om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te gebruik
4. Moontlike newe-effekte
5. Hoe om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te bêre
6. Inhoud van die pak en ander inligting

1. Wat DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is en waarvoor dit gebruik word:

Die aktiewe bestanddeel in DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is aspirien. Dit werk om pyn van matige intensiteit te verlig.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER-tablette is aangedui vir die verligting van pyn van matige intensiteit.

2. Wat u moet weet voor dat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink:

Moenie DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink as:

- U hypersensitief (allergies) vir aspirien of vir enige van die ander bestanddele van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is nie.
- U erge hartprobleme het of gehad het nie.
- U'n geskiedenis van maagbloeding vanweë NSAIM's het nie.
- U'n maagseer, maaggerasie of maagbloeding het of ooit gehad het nie.
- U erge nierserasing het nie.
- U'n bloedingsversteuring het nie.
- U orale antikoagulantie gebruik nie.
- U swanger is of u baba borsvoed nie.
- Jy jonger as 12 jaar is nie (sien Waarskuwings en voorsorgmaatreëls).

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls:

Wees veral versigtig met DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

- U moet DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER nie vir langer as tien dae aaneenlopend gebruik sonder om u dokter te raadpleeg nie.
- As dit aan kinders gegee word, kan DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER Reye se sindroom veroorsaak. Reye se sindroom is 'n baie seldsame siekte wat dodelik kan wees. Om hierdie rede moet DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER nie aan kinders onder die ouderdom van 12 jaar gegee word nie, tenys op advyses van 'n dokter (sien Moenie DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink nie).
- As u ernstige velreaksies, velutslag, toe bors, hyg of asemhalingsprobleme ondervind, moet u onmiddellik ophou om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te drink.

Sé vir u dokter of apoteker voor dat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink as u:

- 'n geskiedenis van allergiese reaksies op NSAIM's het, waaronder astma-aanvalle, swelling van u gesig, lippe en tong, galbulte, jeukerige vel of loopneus ingesluis is.
- ander allergieë of astma het.

• hoë bloeddruk het en/of aan hartprobleme ly. DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER kan moontlik met 'n effens hoër risiko vir hartversaking gepaardgaan.

• 'n bejaarde persoon is; u kan danl meer vatbaar vir die newe-effekte van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER wees.

• 'n geskiedenis van inflammatoriese ingewandsiektes het, soos ulceratiewe kolitis of Crohn se siekte (chneriese ontsteking en sere in die binnestel voering van u kolon).

• 'n geskiedenis van gastro-intestinale siektes het, soos hiatus hernia, gastro-esofageale refluxsiekte ('n toestand waarin die maaginhoud vanaf die maag terug in die slukmerk opstoet, wat soobrand veroorsaak), of bloeding in die spysverteringskanaal.

• vir 'n chirurgiese prosedure geskeledeer is. U moet 'n paar dae voor u operasie ophou om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te gebruik.

• lever- of nierprobleme het.

• bloedarmoede het of ly aan 'n tekort aan die ensiem glukose-6-fosfataatdehydrogenase (G6FD).

• diabetes het.

• ontwater is (u kan dors voel en hoofpyn, droë mond en lippe hê).

• simptome soos 'n hoë liggaamstemperatuur, wydverspreide uitslag, geswelde klieres of gesigswelling ontwikkel. Hierdie reaksie kan ook disfunksie van die niere, lever en hart asook abnormale uitslae van bloedtoetse wees (byvoorbeeld 'n abnormale toename in die aantal siektelebestrystende witbloedselle).

As u nie seker is of enige van die bogenoemde op u van toepassing is nie, moet u u dokter vra.

Gebruik van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER terwyl u

20 weke of meer as 20 weke swanger is, kan ernstige nierprobleme in u ongebore baba veroorsaak. Dit kan 'n vertraging in u baba se longontwikkeling veroorsaak,

asook gestremheid in die ledemate tot gevold hê.

Gereeld gebruik van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER kan tot hoë bloeddruk in u baba se longe lei. Die aanveng van kraam kan vertraag en die duur daarvan kan verleng word. U moet nie DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER tydens swangerskap drink nie en ook nie as u u baba borsvoed nie.

Ander medisyne en DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER:

Se altyd vir u verskaffer van gesondheidsorg as u enige ander medisyne gebruik (dit sluit aanvullende en tradisionele medisyne in).

Dit is veral belangrik dat u vir u dokter sê indien u die volgende middels gebruik:

- ander nie-steroidiese anti-inflammatoriese middels
- NSAIM's (soos ibuprofeen, naproksen, fenbufeen, indometasien en piroksikam).
- kortikosteroïede (om die immuunstelsel te onderdruk).
- medisyne wat bloedstolling stop, soos warfarien.
- SSHR's (selektyiewe serotoninheropnameremmers) soos sertralien of paroksetien (medisyne om depressie te behandel).
- medisyne wat u urene meer alkalis maak, soos teensuurmiddels.
- medisyne gebruik vir jig, soos probenesied en sulfonpirasoon.
- mifepristoon (om abortus te induseer).
- sulfonielureums (antidiabetika).
- metotreksaat (om sommige kankers, psoriase en rumatisiese siektes te behandel).
- fenitoïen of sodiumvalproaat (om epilepsie te behandel).
- sarfirlukast (om astma te behandel).
- metoklopramide (om naarheid te voorkom).
- metoprolol (om angina te behandel).
- asetasololamid (om gluukoom te behandel).
- barbiturate en ander kalmeermiddels.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER kan met bloed- en

uretoetse inmeng. As u bloed- en uretoetse ondergaan, sé vir u dokter dat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER saam met kos of drank:
U moet nie alkohol drink terwyl u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink nie.

Swangerskap en borsvoeding:

As u swanger is of u baba borsvoed, moet u asseblief vir u dokter, apoteker of ander gesondheidsorgverskaffer om advies vra voordat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER gebruik.

U moetie DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER tydens swangerskap of tydens borsvoeding drink nie.

Motorbestuur en gebruik van masjinerie:

Dit is nie altyd moontlik om te voorspel tot watter mate DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER met die daaglike aktiwiteitie van 'n pasiënt kan inmeng nie. U moet weet hoe u op DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER reageer voordat u 'n voertuig bestuur of masjinerie hantere.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER bevat sukrose:

As u dokter dus vir u gesê het dat u 'n onverdraagbaardheid teenoor sekere suikers het, moet u u dokter skakel voordat u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER drink.

3. Hoe om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te drink:

Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf is vir enige ander persoon gee nie.

Gebruik DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER altyd presies soos in hierdie voubiljet aangedui, of soos deur u dokter, apoteker of verpleegkundige vir u gesê het. Raadpleeg u dokter, apoteker of verpleegkundige as u nie seker is nie.

Gebruik die laagste effektiewe dosis vir die kortste moontlike duur van behandeling.

VOLWASSENES: Die aanbevolde dosis is een of twee tablette drie keer per dag met water.

As u meer van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER gedrink het as wat u moes:

Raadpleeg u dokter of apoteker in geval van oordosering. As nie een beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum. Neem hierdie voubiljet en die oorlywendende tablette saam.

Simptome van 'n oordosis is onder meer 'n gelui in die ore, 'n gevoel dat alles om jou draai, doofheid, sweet, naardheid, hoofpyn, braking, verwardheid, vinnige asemhalingstempo, koers, koma en hartversaking.

As u vergeet om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te drink:

As u 'n dosis vergeslaan het, drin dit sodra as wat u onthou. As dit egter byna tyd vir u volgende dosis is, slaan die dosis wat gemis is oor en drink die tablette op die gewone tyd. Moenie 'n dubbele dosis drink om vir die vergeete individuele dosisse op te maak nie.

4. Moontlike newe-effekte:

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER kan newe-effekte hê. Nie al die newe-effekte wat vir DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER aangedui is, is in hierdie blad opgeneem nie. As u algemene gesondheidstoestand vererger of as u enige newe-effekteervaar terwyl u DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER gebruik, moet u u dokter, apoteker of ander gesondheidsorgverskaffer om advies raadpleeg.

Indien enige van die volgende voorkom, moet u ophou om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te drink en onmiddellik vir u dokter sê of na die ongevalle-afdeling van u naaste hospitaal gaan:

- U het 'n allergiese reaksie. Die tekenes kan die volg van die wees: 'n veluitslag, sluk- of asemhalingsprobleme, hys, verergering van asma, swelling van die lippe, gesig, keel of tong.
- U kry blase, afdop, bloeding, skubbe of vloeistofge vulde kolle op enige deel van die vel. U mag 'n ernstige velprobleem hê.
- U het koers en geel verkleuring van die vel of die wit van die oë, voel moeg, swak of algemeen sleg, verlies aan eetlus (anoreksie), naardheid (mislikheid), braking (bring op). Dit kan vroeë tekenes van leverprobleme wees.
- U het maagsere of bloeding wat ernstig kan wees (u kan bloederige of swart teeragtige stoeilang ontwikkel, erga maagpyn hê en bloed opbring), maagirritisatie (ligte maagpyn, soobrand en voel naart van bring op). Dit kan vroeë tekenes van leverprobleme wees.
- U het hoersiere of bloeding wat ernstig kan wees (u kan bloederige of swart teeragtige stoeilang ontwikkel, erga maagpyn hê en bloed opbring), maagirritisatie (ligte maagpyn, soobrand en voel naart van bring op).
- as u griepagtige simptome met 'n hoë liggaamstemperatuur, wydverspreide uitslag, geswelde klieres of gesigswelling ontwikkel en abnormaliese uitslae van bloedtoetse het (geneesmiddelreaksie met eosinofilie en sistemiese simptome (GRESS)).

Dit is almal baie ernstige newe-effekte. As u dit het, mag u dringende mediese aandag of hospitalisasie nodig hê.

Ander newe-effekte is onder meer:

- Langer bloeddingstyd
- Afname in die aantal rooibloedselle wat die vel bleek kan maak en swakheid of uitasemheid kan veroorsaak, veranderinge in aantal en soorte bloedselle wat in bloedtoetse gesien word.
- Duiselighed
- Swelling
- Hoë bloeddruk en hartversaking.
- Maagsere
- Bloeding vanuit die spysverteringskanaal.
- Naardheid (voel mislik), braking (bring op), diarree
- Slegte spysvertering, hardlywigheid, maagpyn
- Braak bloed of bloed in die stoeilang.
- Verergering van inflammatoriese siektes.
- Leverprobleme
- Jeukerige veluitslag veroorsaak deur allergiese reaksie, bleek of rooi onreëlmatige opgehewe kolle met erg gejeuk (galbulte).
- Blase, afdop, bloeding, skubbe of vloeistofgevulde kolle op enige deel van die vel.
- Loopneus
- Probleme met asemhaling of hys, verergering van astma.

As u enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie blad genoem word nie, moet u u dokter of apoteker asseblief in kennis stel.

Aanmeld van newe-effekte:

Indien jy newe effekteervaar, praat met jou dokter, apoteker of verpleegster. Jy kan newe effekte aanmeld by SAHPRA deur die "6.04 Adverse Drug Reaction Reporting Form", wat aanlyn beskikbaar is onder SAHPRA se publikasies: https://sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/01/6.04_ARF1_v5.1_27Jan2020.pdf, te voltooi. Deur newe effekte te rapporteer, help jy om meer inligting oor die veiligheid van DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te voorsien.

5. Hoe om DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER te bêre:

Hou alle medisyne buite bereik van kinders. Bêre in diggeslotte hours of by of onder 25 °C op 'n droë plek.

Ongebruikte medisyne moet nie in dreinering- of riolstellelsels (bv. toilette) gegooi word nie. Gee alle ongebruikte medisyne terug aan u apoteker.

6. Inhoud van die pak en ander inligting:

Wat die DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER bevat:

Die aktiewe bestanddeel is aspirien.
Die ander bestanddele is mielie-stysel, talk en suiker en styselkorrelles wat bestaan uit benosoësuur (preserveermiddel), gelatienpoeier, mielie-stysel en sukrose.

Hoek DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER lyk en inhoud van die pak:

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER is 'n ronde, wit tablet met 'n breeklyn en met 'n suur smaak en reuk.

DR DU TOIT'S PAIN EXPELLER word in aluminium-aluminium stulpstroke verpak.

Stulpstroke seewe of tien tablette per strook. Twee of drie stroke word saam met die voubiljet in 'n karton verpak.

Pakgroottes sluit dus dus die volgende in 14 of 30 tablette per karton.

Houer van die registrasiesertifikaat:

iPharma (Edms) Bpk

Elevationlaan 124, Randjesfontein

Midrand, 1683, Suid-Afrika

Tel.no: 011 314 2366.

Hierdie blad is laas goedgekeur op:

07 Januarie 2022

Registrasienommer:

B/2.8/977

Die volledige Professionele Inligtingsvoubiljet is beskikbaar by iPharma (Edms) Bpk, stuur asseblief info@ipharma.co.za om 'n digitale kopie te versoek.

PIL B977-3